



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
Növényvédelmi és Agrár-környezetgazdálkodási
Főosztály

Szám: 48249/2000.
Előadó: Dr. Ocskó Z.
Szentey L.

Tárgy: **ACORD 500 SC**
gyomirtó permetezőszer korlátozott
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélye

AgroDan A/S
Dánia

Az 1988. évi 2.Tvr. 14.§-a és az 5/1988. (IV.26.) MÉM sz. rendelet 35.§-a alapján a *Acord 500 SC* gyomirtó permetezőszer *korlátozott* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel adom ki:

1. Gyártó vállalat: AgroDan A/S, Dánia.

2. A szer faja: 500 g/l etofumezát = 2-etoxi-2,3-dihidro-3,3-dimetil-5-benzofuranil-metánszulfonát hatóanyagot tartalmazó folyékony gyomirtó permetezőszer.

3. Előírt minőségi feltételek:

hatóanyag tartalom (HPLC):	45,0 ± 2,0 % (m/m)
szuszpenzióstabilitás (30 perc után, 30°C-on):	min. 70 %

4. Felhasználható:

kultúra	károsító	a kijuttatáshoz szükséges szer víz mennyisége (l/ha)	
cukorrépa	magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények	1,5-2,0	200-300

5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők:

Gyenge méreg.
Halakra mérsékelten veszélyes.
Méhekre nem veszélyes.
Közegészségügyi szempontból veszélyes.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék:

kultúra	várakozási idő (nap)	megengedett maradék (mg/kg)
cukorrépa	előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs	0,5

Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyásokba, tározókba, állóvizekbe juttatni.

6. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: egyéni védőfelszerelés *előkészítőknél és kijuttatóknál*: növényvédelmi védőruha, -védőkesztyű, -védőkalap, -védőszemüveg, védőlábbeli.

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: *általános eljárás*/ orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.

7. Tűzveszélyességi besorolás: Nem tűzveszélyes (E).

8. Forgalmazási kategória: I.

9. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

10. Az engedély érvényessége: 2003. március 1.

Mellékletek

1. Javasolt növényvédelmi technológia:

A készítményt a cukorrépa kelése után posztemergensen kell kijuttatni, a jobb hatékonyság érdekében osztott kezelés formájában. Az első kezelést a cukorrépa 2-4 leveles, a magról kelő egyszikű gyomnövények gyökérváltásáig, a magról kelő kétszikűek kelése után, azok 2 valódi leveles koráig kell elvégezni. A második kezelést ezt követően 6-8 nap múlva lehet végrehajtani. A gyomirtási spektrum szélesítése céljából a készítményt fenmedifam, metamitron, kloridazon hatóanyagú herbicidek engedélyezett dóziséval célszerű kombinálni. A kijuttatott szer mennyiség osztott kezeléseket esetében sem haladhatja meg az egyes készítmények engedélyokiratban meghatározott felső dóziséval. Kombinációban a készítmény egy hektárra megadott dózisa csökkenthető.

Erős napsütésben, 25°C feletti léghőmérséklet esetén tilos permetezni, ilyenkor a munkát a hűvösebb, esti órákban kell elvégezni. Növényi károsítók, rovarkártevők (gyökérfekély, répabolha, répabarkó) által legyengített, vagy egyéb más okból legyengült cukorrépát tilos kezelni.

2. Légi kijuttatás: -

3. Tájékoztató adatok:

- patkányon p.o. LD₅₀: > 2000 mg/kg
- enyhén szem- és bőrirritatív hatású készítmény.

Budapest, 2000. március 1.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelű

(Derzsi Anikó)

