



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária
HATÁROZAT SZÁM: 04.2/1363-1/2012
OLDALAK SZÁMA: 2
MELLÉKLET: -

**TÁRGY: Microthiol Special gombaölő
permetezőszer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének módosítása**

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) az Vivamus Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (8272 Szentantalfa, Fő u. 86) által képviselt Cerexagri / United Phosphorus Limited (1, Rue des Frères Lumière BP 9 78370 Plaisir, Franciaország) engedélyes Microthiol Special gombaölő permetezőszerének forgalomba hozatali és felhasználási engedélye módosítása tárgyában meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t :

Az Engedélyező hatóság a Microthiol Special gombaölő permetezőszer MÉM 67906/1980. számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételek mellett módosítja:

I. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

kultúra	károsító	kijuttatáshoz szükséges készítmény (kg/ha) permetlé (l/ha) mennyisége	
kalászosok (búza, árpa, tritikále, rozs, zab)	lisztharmat	5,0	250-400
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	lisztharmat, atkák (gyérítés)	3,0-7,0	600-1200
csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszi, szilva)	lisztharmat, levéllikasztó gombák	5,0-7,0	600-1200
bogyósok (málna, szeder, köszméte, piros ribiszke, fekete ribiszke, szamóca)	lisztharmat	3,0-7,0	600-1200
szőlő	lisztharmat, atkák (gyérítés)	2,0-5,0	600-1200
petrezselyem, uborka	lisztharmat	3,0-5,0	400-600

II. Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

7. munkaegészségügyi óvórendszabályok:

egyéni védőfelszerelés

előkészítőknak: Növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, P2-es szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc, védőlábbeli.

kijuttatóknak: Növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.

Óvatos munkával kerülni kell a szer elszóródását, elporlását, a tömény permetlé szembe bőrre jutását, belélegzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó és felsőruha váltása szükséges.

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (általános eljárás) után orvosi ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti, megfigyelő kezelés

Ellenanyag: speciális antidótuma nincs

III. Az engedélyokirat *Melléklet-ének* 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Javasolt növényvédelmi technológia:

25 °C felett - az esetleges perzselések elkerülése érdekében - a készítmény nem alkalmazható!

A szer alkalmazásakor figyelemmel kell lenni egyes növényfajták kénérzékenységre.

A készítmény hatásossága nedvesítőszer hozzáadásával és nagy permetlé mennyiség használatával fokozható. A kezelés során törekedni kell a tökéletes permetléborításra, különösen a levelek fonákán.

Kalászosokban (búza, árpa, tritikále, rozs, zab) az első kezelést tavasszal, a lisztharmat tüneteinek megjelenésekor, szárbaindulás kezdetén, a második kezelést kalászhányás végén, virágzás elején célszerű elvégezni.

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) virágzás előtt 5,0-7,0; virágzás után 3,0-5,0 kg/ha-os dózisban célszerű kijuttatni. A permetezést egérfül állapotban kell megkezdeni és legfeljebb 7-10 naponként, a fertőzési nyomástól függően célszerű megismételni.

Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajsz, szilva) levéllyukacsosodás és lisztharmat ellen 5,0-7,0 kg/ha-os dózisban célszerű felhasználni. Az első permetezést fertőzésveszélyes időszakban, legkésőbb a tünetek megjelenésekor ajánlott elvégezni, és legfeljebb 7-10 naponként, a fertőzési nyomástól függően lehet megismételni.

Bogyósokban (málna, szeder, köszméte, piros ribiszke, fekete ribiszke, szamóca) lisztharmat ellen virágzás előtt 5-7 kg/ha, virágzás után 3-5 kg/ha mennyiségben célszerű kijuttatni.

Szőlőben virágzás előtt 2,0-5,0; virágzás után 2,0-3,0 kg/ha-os dózisban kell végrehajtani a kezeléseket. A védekezést 2-4 leveles hajtáshossznál célszerű elkezdni, és 7-10 naponként, a szőlőfajta fogékonyságától és a fertőzési nyomástól függően meg lehet ismételni.

A szőlő intenzív fejlődési szakaszában a készítmény felhasználható a felszívódó szerek kontakt kiegészítőjeként, ugyanazon dózisokban.

Petrezselyemben és uborkában a kezelést a fertőzés megjelenésekor célszerű végrehajtani, és szükség esetén 1-3 alkalommal meg lehet ismételni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Bíróságtól** a határozatot hozó **Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2012. március 7.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél képviselője
2. Irattár

(63/2012)